

Số: / TB - TTDVNN

Thanh Miện, ngày tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI VỤ CHIÊM XUÂN NĂM 2023
(Từ ngày 05/5 đến ngày 12/5 năm 2023)

Kính gửi: - Chi cục Trồng trọt và BVTV Hải Dương;
- Thường trực huyện ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND huyện;
- Các ngành, UBND các xã, thị trấn;
- Các HTX dịch vụ nông nghiệp; Các đại lý buôn bán thuốc

BVTV.

I/ TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết:

Từ giữa tháng 4 đến nay thời tiết mát mẻ, trưa chiều hửng nắng, ẩm độ không khí cao. Từ ngày 25/4 do ảnh hưởng của không khí lạnh làm nhiệt độ giảm gây mưa. Nhiệt độ trung bình từ 26 -34°C, Ẩm độ 80-95%

2. Cây trồng:

- Cây lúa: Lúa đại trà đang giai đoạn đồng non – đồng già. Một số diện tích lúa sớm đang giai đoạn thấp tro – tro bông.

- Nhãn, vải: đang giai đoạn quả nhỏ;

- Ngô: đang giai đoạn 9 lá - tro cò, phun râu, thu hoạch;

- Dưa chuột: đang giai đoạn ra hoa, thu quả;

- Dưa lê: đang giai đoạn trồng – phát triển thân lá, đậu quả, thu hoạch;

- Bầu bí, mướp: đang giai đoạn trồng – phát triển thân lá, ra hoa đậu quả, thu hoạch;

- Rau các loại: trồng - phát triển thân, lá, thu hoạch.

II. TÌNH HÌNH DỊCH HẠI ĐẾN NGÀY 04/5/2023

1. Cây lúa:

- Bệnh đạo ôn lá: bệnh gây hại giảm do cây lúa chuyển sang giai đoạn làm đồng – tro bông các lá gọn lại. Một số ô lụi được phun trừ hiệu quả đến nay đã hồi phục.

- Bệnh khô vằn: Gây hại tăng trên các ruộng xanh tốt, bón nhiều đạm, các ruộng có chế độ nước không thường xuyên. Tỷ lệ bệnh trung bình 5-10% đánh, chỗ cao 20-25% đánh C1-C3.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành vũ hóa rải rác, vũ hóa rộ từ ngày 25 – 29/4 trên những ruộng xanh tốt, gần làng, gần đường đi, diện tích lúa non đang giai đoạn phân hóa đồng – đồng già. Mật độ trung bình từ 1-2 con/m², chỗ cao 3-5 con/m².

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: xuất hiện cục bộ trên các ruộng chua trũng, chân đường mạ mật độ 5-10 con/khóm, chỗ cao 20-25 con/khóm.

- Chuột: chuột gây hại tăng các diện tích lúa xanh tốt gần làng, ven đường đi, gần khu chuyên đồi đặc biệt là diện tích lúa gieo vãi, ruộng cạn nước bị gây hại tăng hơn.

-Ngoài ra còn có các đối tượng khác như bọ trĩ, rệp xanh, ruồi đục nõn: gây hại với mức độ thấp.

2. Nhãn, vải:

- Bệnh sương mai nhũn, vải gây hại tăng. Sâu đo, bọ xít, rệp muội, rệp sáp... mật độ tỷ lệ gây hại nhẹ.

- Sâu đục cuống quả vải: trưởng thành vũ hóa đẻ trứng trên trà vải sớm.

3. Dưa chuột, dưa lê, bầu bí các loại:

- Bệnh giả sương mai, bọ trĩ, bọ phấn: đang gây hại các ruộng dưa chuột giai đoạn ra hoa - thu hoạch.

4. Ngô: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân, bệnh gỉ sắt, bệnh đốm lá... gây hại nhẹ.

III/ DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI ĐẾN NGÀY 12/5/2023

1. Cây lúa:

- Sâu cuốn lá nhỏ: Dự kiến sâu non nở rộ từ 5-10/5 tập trung trên diện tích lúa đang giai đoạn phân hóa đòng - đòng già, những diện tích lúa xanh tốt, gần làng, gần đường đi.

- Bệnh đạo ôn cổ bông: gây hại cho các giống nhiễm như Nếp, BC15, TBR225, Q5,... đặc biệt các ruộng bị đạo ôn lá giai đoạn đòng già - trổ bông, chắc xanh nếu gặp điều kiện có mưa, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm cao.

- Bệnh đạo ôn lá: Bệnh sẽ tiếp tục phát sinh gây hại trên diện tích lúa muống đang giai đoạn cuối đẻ nhánh - phân hóa đòng.

- Bệnh khô vằn: Bệnh gây hại tăng và leo cao lên các lá phía trên gây hại lá đòng và lá cận đòng làm giảm năng suất và khả năng chống đổ.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: gây hại tăng trên diện tích lúa đòng già - trổ bông.

2. Nhãn, vải:

- Sâu đục cuống quả vải: sâu non gây hại làm cho quả non bị rụng quả gây giảm năng suất.

- Sâu đo, bọ xít: gặm ăn, chích hút các bộ phận non của cây như nụ, hoa, quả non làm giảm số lượng và chất lượng quả. Sâu đo, bọ xít sẽ tiếp tục phát sinh gây hại trong thời gian tới.

3. Dưa chuột, dưa lê, bầu bí:

- Bệnh giả sương mai: tiếp tục gây hại tăng trên những ruộng dưa chuột giai đoạn ra hoa, đậu quả, thu hoạch.

- Bệnh phấn trắng, bệnh héo vàng, héo xanh có khả năng gây hại trong thời gian tới.

- Bọ phấn, bọ trĩ: gây hại dưa giai đoạn trồng - thu hoạch

4. Ngô:

- Sâu keo mùa thu: Sâu gây hại ngô giai đoạn từ 7 - trổ cờ, phun râu.

- Sâu đục thân ngô: sâu gây hại giai đoạn xoắn nõn - trổ cờ;

- Bệnh gỉ sắt: gây hại tăng ngô giai đoạn xoắn nõn - trổ cờ, thu hoạch.

IV. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

1. Cây lúa:

- Bệnh đạo ôn cổ bông:

Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại các giống nhiễm như Nếp, Q5, BC15, TBR225, Thiên ưu 8,... các ruộng bị bệnh đạo ôn lá khi cây lúa giai đoạn đòng già - chắc xanh khi thời tiết có mưa nhỏ, mưa phùn, ẩm độ không khí cao, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm lớn, các ruộng đang bị bệnh. Nếu không phun trừ tốt sẽ gây bông bạc làm giảm năng suất hoặc bị nặng có thể không cho thu hoạch. Vì vậy để phòng trừ tốt bệnh đạo ôn cổ bông cần phun lần 1 khi lúa thấp thỏ trổ và phun lại lần 2 sau lần 1 từ 7-10 ngày.

Dùng các loại thuốc như: Ninja; Beam, Filia, Roshow, Katana, Fuji-one, Nativo, ..

- Sâu cuốn lá nhỏ:

Thời gian phun trừ từ ngày 05-10/5. Sâu gây hại trên lúa đại trà và lúa muộn giai đoạn lúa phân hóa đòng – đòng. Sâu gây hại lá đòng, lá cận đòng nếu phun trừ không tốt sẽ gây trắng lá ảnh hưởng đến năng suất.

Vì vậy các ngành, các địa phương cần hướng dẫn nhân dân tăng cường kiểm tra đòng ruộng và phun đúng thời điểm sâu nở rộ từ ngày 05-10/5 đặc biệt trên diện tích lúa muộn đang giai phân hóa đòng – đòng non.

Dùng các thuốc như: Obaone, Voliam Tango, Solo, Virtako, Prevathon, Takumi, Ameri, ...

- Rầy nâu, rầy lưng trắng:

Rầy sẽ gây hại từ nay đến cuối vụ. Vì vậy các ngành, các địa phương khuyến cáo nhân dân thường xuyên kiểm tra rầy nếu thấy rầy cảm có mật độ trên 20 con/khóm trở lên thì tiến hành phun trừ ngay.

Dùng các thuốc như: Chess, Oshin, Chetsduc, Chatot, Cherry,...

- Bệnh khô vằn:

Bệnh phát sinh gây hại tăng trên tất cả các trà, giống lúa và gây hại đến cuối vụ. Vì vậy các địa phương cần khuyến cáo nông dân tăng cường kiểm tra đòng ruộng phát hiện bệnh đặc biệt các ruộng gieo vãi dày, cây dày, cây to, các ruộng có chế độ nước không thường xuyên thường bị bệnh cao hơn. Khi thấy bệnh hại 10% đánh trở lên thì tiến hành phun trừ ngay. Dùng các thuốc như: Anvil, Nevo, Tiltvil, Jiavin....

- Bệnh lem lép hạt:

Bệnh gây hại khi lúa trở bông đến chắc xanh khi gặp điều kiện ẩm độ không khí cao, nhiệt độ cao gây lép đen, lép vàng lúa ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng gạo. Vì vậy để nâng cao năng suất và chất lượng gạo bà con nông dân cần phun phòng bệnh lem lép hạt lần 1 khi lúa thấp tho trở và lần 2 sau lần 1 từ 7 -10 ngày. Dùng các thuốc như: Tilt super, Nevo, Nativo,đồng thời trừ được cả bệnh khô vằn.

- Chuột:

Chuột sẽ tiếp gây hại tăng đặc biệt rất khó đánh bắt khi lúa làm đòng vì chuột sẽ ở trong ruộng cắn phá và ăn đòng lúa không ăn mỗi bả. Vì vậy các tổ diệt chuột cần tổ chức đánh bắt các đợt bổ sung cả bằng biện pháp hóa học và thủ công trước ở giai đoạn lúa làm đòng.

2. Trên cây ngô:

- Sâu keo mùa thu gây hại mạnh khi cây ngô giai đoạn 3 – xoắn nõn ăn tước lá, mất ngọn ảnh hưởng đến sinh trưởng, mật độ cây. Đây là đối tượng sâu mới sức gây hại mạnh vì vậy bà con cần theo dõi và phun trừ kịp thời khi sâu tuổi nhỏ: dùng các thuốc như: Solo, Clever, Voliam Tango, Virtako,...

- Sâu đục thân ngô: gây hại giai đoạn cây ngô xoắn nõn – phun râu đặc biệt sâu gây đục vào bắp ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng bắp. Dùng các thuốc như: Voliam Tango, Virtako,...

- Bệnh gỉ sắt ngô:

Bệnh gây tăng khi cây ngô giai đoạn xoắn nõn – thu hoạch. Bệnh gây hại làm cho cây ngô giảm khả năng quang hợp, giảm khả năng tích lũy dinh dưỡng về bắp làm bắp nhỏ, giảm chất lượng. Vì vậy để phòng trừ tốt bệnh này nông dân cần phun trừ sớm khi bệnh chớm xuất hiện.

Dùng các thuốc như: Tolusa, Amistatop, Tiltsuper,...

3 Trên cây họ bầu bí:

- Bệnh sương mai nhãn vải, giả sương mai dưa chuột:

Bệnh gây hại tăng khi gặp điều kiện thời tiết mưa phùn, ẩm độ không khí cao, có gió. Cần phun phòng trừ bệnh đặc biệt là các vườn vải đang ra hoa – đậu quả.

Dùng các thuốc như: Ridomil Gold, Ricide, Aliette, Profiler... phun vào lúc chiều mát.

- **Bọ phấn, bọ trĩ:** Gây hại cây họ bầu bí giai đoạn trồng – ra hoa, đậu quả gây rụng, cây còn cọc kém phát triển ngoài ra còn là đối tượng môi giới truyền bệnh vì rút rất nguy hiểm. Vì vậy bà con cần chú ý kiểm tra đồng ruộng và phun trừ kịp thời. Dùng các thuốc như: Radiant, Oshin, Chess, Fidur,...

Ngoài ra còn một số đối tượng như nhện đỏ, sâu vẽ bùa hại cây có múi, sâu xanh, sâu đo, bọ nhảy trên rau,...../.

Nơi nhận:

Như kính gửi;

Lưu.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Việt Thanh